

# Caladoc N

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité de poils couchés moyenne,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- au rameau herbacé avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes à trois lobes avec un sinus pétiolaire ouvert en U, des dents petites, longues par rapport à leur largeur à la base et à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe faiblement ondulé et, à la face inférieure, une très faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique et qui présentent des taches particulières (des punctuations) sur la pruine.

## Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2<sup>ème</sup> époque, 3 semaines et demie à 4 semaines après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Caladoc N possède une vigueur moyenne. Il peut être taillé court et conduit en gobelet. Sa production est régulière et il n'est pas sujet à la coulure.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Caladoc N résiste bien à la pourriture grise et il est peu sensible à l'oïdium.

## Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont de taille moyenne. Cette variété permet d'élaborer des vins très corsés et typés possédant une couleur intense et une structure tannique intéressante (tanins à la fois assez souples, sans amertume mais très présents). Le Caladoc N se prête également à l'élaboration de vins rosés fruités et équilibrés.

## Sélection clonale

Le seul clone agréé de Caladoc N porte le numéro 724.

## Origine :

Cette variété a été obtenue en 1958 par l'INRA en croisant le Grenache N et le Cot N.

## Utilisation :

Variété de raisin de cuve

### Evolution des surfaces cultivées en France (en ha)

1958	1968	1979	1988	1998	2006
-	-	-	64	914	2 258

